

## **Optimierte Steigerung - beispielhafte „Begründungsliste“:**

### ***Besonderheiten bei Feststellung der Differential-Diagnose***

- ☐ Überlagerte Begleiterkrankungen\_\_\_\_\_
- ☐ Abgrenzung gegenüber anderen Erkrankungen mit ähnlicher Symptomatik\_\_\_\_\_
- ☐ Atypie von Anamnese / Befund\_\_\_\_\_
- ☐ Schwierige Diagnostik wegen atypischer Lokalisation des Krankheitsherdes\_\_\_\_\_
- ☐ Schwierige Interpretation des Befundes\_\_\_\_\_
- ☐ Häufig wechselndes Beschwerdebild (erhebliche differentialdiagnostische Probleme)\_\_\_\_\_

### ***Besonderheiten der Gefäßverhältnisse***

- ☐ Zustand nach Thrombose\_\_\_\_\_
- ☐ Adipositas\_\_\_\_\_
- ☐ Komplizierte Venenverhältnisse\_\_\_\_\_
- ☐ Zustand nach iv. / i.a. Langzeitbehandlung\_\_\_\_\_

### ***Besondere Verhältnisse bei dem Eingriff***

- ☐ Kreislaufzwischenfall\_\_\_\_\_
- ☐ Schockzustand\_\_\_\_\_
- ☐ Risikofaktoren bei akuten Komplikationen\_\_\_\_\_
- ☐ Inkooperativer Patient\_\_\_\_\_
- ☐ Kontrastmittelunverträglichkeit\_\_\_\_\_
- ☐ Vermehrter Zeitaufwand durch Blutstillung nach Biopsie\_\_\_\_\_
- ☐ Erhebliche Spastik bei der Untersuchung\_\_\_\_\_
- ☐ Unruhe des Patienten\_\_\_\_\_
- ☐ Krankheitsbedingte Organanomalien\_\_\_\_\_

### ***Komplizierende Begleiterkrankungen***

- ☐ die entsprechenden Diagnosen angeben\_\_\_\_\_
- ☐ Langzeitbehandlung mit Medikamenten\_\_\_\_\_

### ***Erschwerte Leistungserbringung***

- ☐ Abwehrhaltung des Säuglings bzw. Kleinkindes\_\_\_\_\_
- ☐ Einschränkung der verbalen Kommunikationsmöglichkeit\_\_\_\_\_
- ☐ Adipositas\_\_\_\_\_
- ☐ Atypische Gewebestruktur\_\_\_\_\_
- ☐ Lebensalter des Patienten\_\_\_\_\_
- ☐ Kreislauflabilität\_\_\_\_\_
- ☐ Polytraumatisierung\_\_\_\_\_

### ***Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten***

- ☐ cerebrale Funktions-/Entwicklungsstörung\_\_\_\_\_
- ☐ Lebensalter des Patienten\_\_\_\_\_

**Notwendige langsame Injektion**

- ☐ Kalzium u.a. \_\_\_\_\_
- ☐ Chemotherapie \_\_\_\_\_
- ☐ Unverträglichkeit der Medikamente untereinander \_\_\_\_\_

**Komplizierte Beurteilung durch eingeschränkte Materialgewinnung**

- ☐ Besondere Präparataufbereitung / Sonderfärbung für mikroskopische Beurteilung \_\_\_\_\_

**Besonderheiten der Akuterkrankung in Diagnose und Therapie**

- ☐ Überlagernde Begleiterkrankungen \_\_\_\_\_
- ☐ Therapieresistente Verlaufsform \_\_\_\_\_

**Besonderheiten der Therapiekontrolle**

- ☐ Überlagernde Begleiterkrankungen \_\_\_\_\_
- ☐ Arzneimittelnebenwirkungen \_\_\_\_\_
- ☐ Interferenzwirkung mit anderen Medikamenten \_\_\_\_\_
- ☐ Präoperative Problematik der Differential- und Ausschlussdiagnose mit Beachtung von Zusatz- und Zweitdiagnosen \_\_\_\_\_
- ☐ Operativ bedingte Veränderung \_\_\_\_\_
- ☐ Angrenzung bei ergänzender Anamnese \_\_\_\_\_
- ☐ Normvariante Befunde \_\_\_\_\_
- ☐ Zusätzliche Diagnostik/Therapie wegen wichtiger Begleiterkrankungen \_\_\_\_\_
- ☐ Infektionsausdehnung \_\_\_\_\_
- ☐ Häufig wechselndes Beschwerdebild mit unterschiedlicher Reaktion auf die jeweilige Therapie \_\_\_\_\_

**Besonderheiten der Differential-Therapie**

- ☐ Überlagernde Begleiterkrankungen \_\_\_\_\_
- ☐ Therapeutische mehrdeutige Situation durch Grundkrankheit \_\_\_\_\_
- ☐ Besondere / atypische Therapiereaktion \_\_\_\_\_
- ☐ Aufwendige intraarterielle Therapie \_\_\_\_\_
- ☐ Interferenz mit der Behandlung der Begleiterkrankungen \_\_\_\_\_
- ☐ Erhebliche Nebenwirkungen wegen der Grundkrankheit \_\_\_\_\_
- ☐ Infektionsausdehnung \_\_\_\_\_
- ☐ Therapieresistente Verlaufsform \_\_\_\_\_
- ☐ Unverträglichkeit üblicher Basistherapeutika \_\_\_\_\_

**Komplizierte Indikationsstellung zur Therapie**

- ☐ Lebensalter des Patienten \_\_\_\_\_

**Aufwendige Therapieplanung**

- ☐ Wechselwirkungsproblematik bei notwendiger Mehrfachmedikation \_\_\_\_\_
- ☐ Atypische Reaktionsbereitschaft auf Therapie / Medikation \_\_\_\_\_

**Besonderheiten der gestörten Stoffwechselsituation**

- ☐ Schwierige Neueinstellung des Diabetes \_\_\_\_\_